



Date de rév : 08/01/10

Indice de rév : 02

Date d'appl : 20/01/10

 BOVINE OVINE CAPRINE (1)

(1) Cocher la case correspondante

Exploitant	
Nom	
Raison sociale	
N° Cheptel	
Commune	

Vétérinaire sanitaire	
Nom	
N°ordre cabinet	
Nombre de Km	

## RAPPORT DE VISITE DU VETERINAIRE

## ANIMAL

N° national (2 lettres + 10 chiffres) :	Age :	Rang de gestation :
Date d' avortement :	Mois de gestation :	

## ISOLEMENT DE L' ANIMAL

<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
	<input type="checkbox"/> Hors de l'étable <input type="checkbox"/> Dans l'étable

## PRELEVEMENTS REALISES

<input type="checkbox"/> AVORTON	<input type="checkbox"/> MUCUS VAGINAL	<input type="checkbox"/> Ecouvillon vaginal (Brucellose)
<input type="checkbox"/> PLACENTA Si des analyses complémentaires sont à réaliser, prélever plusieurs houppes placentaires.	<input type="checkbox"/> SANG Justifier si seul le prélèvement de sang est réalisé:	
<input type="checkbox"/> Cinétique : 1er prélèvement: <input type="checkbox"/> ou 2e prélèvement: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DEMANDE DE SEROTHEQUE: Durée:	

Fait à :

, le

signature :

POUR TOUTE RECHERCHE COMPLEMENTAIRE VOIR AU VERSO

DATE D' ENVOI :

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

N° DE DOSSIER :

Date de réception :

Etat :

Veuillez entourer votre choix	Epidémiologie	Types de prélèvements		Analyses possibles	
				au LVD 88	sous traitées
Salmonella spp	Bovins 6 <sup>e</sup> -8 <sup>e</sup> mois de gestation dans 70% des cas.	Avorton	Placenta	Bactériologie (1)	
		Sang		S. dublin	
				S. abortus ovis	
Fièvre Q (Coxiella burnetti)	Avortement à tous les stades de gestation mais surtout après le 6 <sup>e</sup> mois. Métrites fréquentes.	Avorton (3)			PCR (2)
		Ecouvillonnage du col (3)			PCR (2)
		Sang		Sérologie (5)	
Chlamydiae chlamidophilose	Bovins: 6 <sup>e</sup> -9 <sup>e</sup> mois. Derniers mois avortements répétitifs non brucelliques. Métrites fréquentes	Sang		Sérologie (6)	
		Cotylédon (2)			PCR (2)
	Ovins : 25% des avortements. Avortements en série (15j à 3s avant la mise bas)	Sang		Sérologie (6)	
		Cotylédon (2)			PCR (2)
Leptospirose (rare en France)	Avortement 2 <sup>e</sup> moitié de gestation.	Sang			Sérologie
		Cotylédon (2)			PCR (2)
Listériose	7 <sup>e</sup> - 8 <sup>e</sup> mois de gestation chez les bovins.	Cotylédon		Bactériologie	
Campylobacter	Avortement vers le 5 <sup>e</sup> -6 <sup>e</sup> mois de gestation chez les bovins avec rétention embryonnaire.	Avorton		Bactériologie	
Germes pyogènes	On isole fréquemment Arcanobacterium pyogenes, E. coli, Streptococcus pyogenes à différents stades.	Cotylédon		Bactériologie	
Neospora caninum	Avortement entre le 3 <sup>e</sup> et le 7 <sup>e</sup> mois de gestation, pic au 5 <sup>e</sup> mois.	Sang		Sérologie (7)	
		Avorton			PCR (2)(8)
		Avorton (4)			Histologie
Toxoplasma gondi	Brebis: 3 à 5% des cas. Prélever idéalement plusieurs brebis à des stades de gestation différents.	Sang		Sérologie	
IBR	Avortement sporadique 4 <sup>e</sup> -8 <sup>e</sup> mois	Sang		Sérologie	
BVD		Sang		Sérologie	
FCO		Sang		Sérologie	PCR (2)
Aspergillus spp Mucorales Candida spp	7 <sup>e</sup> et 8 <sup>e</sup> mois. Avortement d' hiver. Sporadique.	Cotylédons nécrotiques		Mycologie	Histologie
		Lésions cutanées foetales			
<b>AUTRES DEMANDES</b>		<input type="checkbox"/> Autopsie avorton (préciser votre demande) <input type="checkbox"/> Cinétique d'anticorps (préciser la maladie suspectée) <input type="checkbox"/> Autre:			

Conditions d'envoi: (1) : En 24h ou sous couvert du froid, (2): En 24h ou sous couvert du froid ou congelé.

Conditions de prélèvement : (3): Prélèvement non souillé de matières fécales, (4): Encéphale, cœur, foie.